



LES SIGNES DE GRAVITÉ

SIGNES DE GRAVITÉ GÉNÉRAUX (NON SPÉCIFIQUES À UNE SITUATION)



□ SIGNES NEUROLOGIQUES

- État de conscience : difficilement éveillable à comateux (score de Glasgow),
- Convulsions,
- Paralysie (face, membre, moitié du corps).

□ SIGNES RESPIRATOIRES

- Détresse respiratoire (avec fréquence respiratoire > 25 cycles/min),
- Respiration bruyante,
- Parole difficile, difficulté à aligner trois mots d'affilée,
- Sueurs, cyanose (coloration mauve ou bleutée de la peau, débutant aux extrémités ou au niveau des lèvres).

□ SIGNES CARDIOCIRCULATOIRES

- Malaises successifs avec perte de connaissance,
- Sueurs, marbrures (marques violacées de la peau), cyanose (cf. ci-contre) ou pâleur extrême,
- Douleur thoracique,
- Hémorragie,

• Prise d'anticoagulants :

- Héparines ou HBPM
- Anti vitamines K :
 - Fluindione (Previscan)
 - Adenocoumarol (Sintrom)
 - Warfarine (Coumadine)
- AOD :
 - Dabigatran (Pradaxa)
 - Apixaban (Eliquis)
 - Rivaroxaban (Xarelto)

Si cela est possible, la prise de paramètres permet de rechercher des signes de gravité. La prise de paramètres ne doit être effectuée que par la personne habilitée. Les taux présentés ci-dessous représentent les valeurs standards de ces constantes.

- **Fréquence cardiaque (pouls)** : < 50/min ou > 100/min
- **Pression artérielle** : < 100 mmHg ou > 200 mm Hg aux 2 bras
- **Fréquence respiratoire** : ≤ 10/min ou ≥ 25/min
- **SPO₂ (saturation)** : < 92 % (hors insuffisance respiratoire chronique)
- **Hypothermie / Hyperthermie** (si association avec les signes cités en parallèle) :

≤ 35,0	35,1 – 36,0	36,1 – 38,0	38,1 – 39,0	≥ 39,0
--------	-------------	-------------	-------------	--------

Pour être fiables, les paramètres doivent être pris dans de bonnes conditions. La prise des paramètres n'est pas une priorité. C'est l'identification de l'urgence notamment par les signes cliniques qui prime. Par contre, la connaissance des paramètres cliniques permet de compléter l'appreciation de l'état clinique du patient et notamment sa gravité.



LES SIGNES DE GRAVITÉ

SIGNES DE GRAVITÉ SPÉCIFIQUES

>> Se référer à chaque fiche de conduite à tenir

SCORE DE GLASGOW (DE 3 À 15)*

OUVERTURE DES YEUX	RÉPONSE VERBALE	RÉPONSE MOTRICE
4 : Spontanée	5 : Orientée	6 : À la demande
3 : À l'appel	4 : Confuse	5 : Adaptée à la douleur
2 : À la douleur	3 : Incohérente	4 : Retrait
1 : Nulle	2 : Incompréhensible	3 : Flexion stéréotypée
	1 : Nulle	2 : Extension stéréotypée (décérébration)
		1 : Nulle

Consignes : pour chaque colonne, attribuer le score correspondant à l'état du résident.


L'addition des trois scores donne le résultat du test.

*15 : Conscience normale, somnolence ou coma léger,


8 et en dessous : grave, coma lourd,

3 : mort cérébrale

ACTIONS



J'APPELLE LE MÉDECIN
SI PRÉSENT SUR SITE



SINON, J'APPELLE DIRECTEMENT
LE SAMU/CENTRE 15